HIPUR-IPEN

iodoipurato de sódio (131 I)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

ATENÇÃO

HIPUR-IPEN É PARA USO EXCLUSIVO EM RADIODIAGNÓSTICO NA MEDICINA NUCLEAR

USO RESTRITO A HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS

APRESENTAÇÃO

O HIPUR-IPEN possui as seguintes apresentações na data de calibração:
HIPUR-IPEN 185 MBq: 185 MBq (05 mCi) de iodoipurato de sódio (131 I)
HIPUR-IPEN 370 MBq: 370 MBq (10 mCi) de iodoipurato de sódio (131 I).

Forma farmacêutica

Solução injetável.

ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada frasco-ampola contém na data de calibração:
185 MBq (05 mCi) de iodoipurato de sódio (131 I)
370 MBq (10 mCi) de iodoipurato de sódio (131 I)
Cada frasco ampola contém o seguinte excipiente: solução de cloreto de sódio 0,9%.
A atividade solicitada e o volume são informados no rótulo da embalagem do produto, bem como a data e hora para a qual a atividade foi calibrada.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O iodoipurato de sódio (131 I) é um radiofármaco utilizado para determinação do fluxo renal plasmático efetivo.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O iodoipurato de sódio (131 I) é um radiofármaco utilizado para diagnóstico em Medicina Nuclear. É uma substância radioativa que é eliminada exclusivamente pelos rins.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Hipersensibilidade ao iodoipurato de sódio (131 I) ou qualquer outro componente da formulação.

Categoria de risco na gravidez: C. este medicamento não deve ser utilizado em mulher grávida sem a avaliação prévia do médico responsável. Informe ao médico a ocorrência ou suspeita de gravidez. Em caso de amamentação, substituir o leite materno por alimentação artificial.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O médico responsável pela utilização do medicamento informará sobre a necessidade de algum preparo antes do uso.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é de uso restrito a hospitais e clínicas especializadas.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido.
Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
Solução límpida e incolor.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este produto só pode ser preparado e administrado em estabelecimento clínico credenciado pelas entidades de controle nuclear e sanitário, de forma a cumprir simultaneamente os requisitos de proteção contra radiações e os de qualidade farmacêutica. Após serem coletados dados sobre a indicação do exame, é injetada uma pequena quantidade de iodoipurato de sódio (131 I) na veia do paciente para a realização do procedimento. No momento da liberação, o paciente receberá instruções de quais os cuidados deverão ser tomados. É recomendável aumentar a eliminação do medicamento forçando a diurese com ingestão de líquidos e esvaziamento da bexiga.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O médico responsável pela utilização do medicamento informará sobre a necessidade de algum preparo antes do uso. O médico avaliará a necessidade de repetição do exame.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

De uma forma geral, as reações adversas relacionadas aos radiofármacos são raras ou muito raras e são comumente leves, reversíveis, sem muita gravidade e geralmente não necessitam de intervenção médica. Reações alérgicas ao radiofármaco iodoipurato de sódio (131 I) podem ocorrer e, dependendo da intensidade delas, intervenção médica pode ser necessária.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.
Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.